

Рекомендации
по применению пробиотических препаратов на птице яичного направления с
целью профилактики инфекционных заболеваний, укрепления иммунитета,
улучшения конверсии корма

Возраст, дни	Наименование препаратов	Дозы и способы введения	
0 день, в инкубатории перед отправкой цыплят в транспортной таре	Кормовая добавка «Моноспорин КД» + кормовая добавка «Пролам КД» + пшено	1-1,5 кг на 10 тыс. цыплят	посыпать на цыплят сверху
	Кормовая добавка «Моноспорин КД» + кормовая добавка «Пролам КД» (1:3)	25 мл на 100 голов цыплят	крупно-дисперсное опрыскивание цыплят
1-5 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,03 мл/гол	в течение 3- 4 ч методом выпойки с водой
6-10 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	- // -
22-28 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
60-64 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,03 мл/гол	-//-
65-69 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
90-94 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,03 мл/гол	-//-
95-99 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
120-124 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
125-129 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
159-163 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
164-168 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
198-202 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
203-207 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
237-241 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
242-246 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
276-280 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
281-285 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
315-319 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
320-324 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
354-358 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
359-363 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
393-397 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
398-402 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-
432-436 день	Кормовая добавка «Моноспорин КД»	0,2 мл/гол	-//-
437-441 день	Кормовая добавка «Пролам КД»	0,1 мл/гол	-//-

Примечание: для повышения усвояемости кормов, укрепления иммунитета, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку «Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» из расчёта 2-3 кг на 1 т корма (0,2% - 0,3%).

Расход препаратов на 1 голову*:

I. В инкубатории

«Моноспорин КД» – 0,0825 мл/гол

«Пролам КД» – 0,2625 мл/гол

II. За период 1-140 дней

«Моноспорин КД» – 1,45 мл/гол

«Пролам КД» – 2,5 мл/гол

«Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» – 16-24 гр/гол (в составе комбикорма)

III. За период 141-441 дней

«Моноспорин КД» – 8 мл/гол

«Пролам КД» – 4 мл/гол

«Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» – 71,3-107 гр/гол (в составе комбикорма)

За весь период:

«Моноспорин КД»

9,5325 мл/гол

«Пролам КД»

6,7625 мл/гол

«Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ»

87,3-131 гр/гол

Зимин К.В., Главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»
Тел.: 8(928)420-03-89; эл.адрес: konstantin.zimin.59@mail.ru